


Türk Tıbbi Onkoloji Derneđi  
Covid19 Pandemisi Danıřma Kurulu  
Güncellenmiř Önerileri

# “ Kanser Hastalarında Ařılama Önerileri ”

\*\*\*Bu öneriler ulusal ve uluslararası kılavuzlar eřliđinde  
bugünkü kořullar dikkate alınarak yapılmıřtır.  
Önerilerin deđiřen kořullara göre yenilenmesi planlanmıřtır.

-Aralık 2020-





**Tüm kanser hastaları  
erişkin aşılama  
şemalarında bulunan  
aşuların uygulanması  
açısından  
değerlendirilmelidir.**

**Aktif tedavi almayan  
hastaliksız takipteki  
tüm kanser hastalarına  
erişkin aşı şemasında  
olan tüm aşular yapılabilir.**



**Aktif kanser kemoterapisi alan hastalar ve uzun süreli kortizon tedavisi alan hastaların bağışıklık sistemi baskılanmıştır.**

**Bu hastalarda suçiçeği, zona, kızamık gibi canlı veya zayıflatılmış aşı yapılmamalıdır.**

**Grip, zatürre, tetanoz, difteri aşıları inaktive aşılardır ve yapılmasının zararı yoktur.**

**Ancak yeterli bağışıklık oluşabilmesi için mümkünse tedavi başlamadan 2 hafta önce veya 3 ay sonra yapılmalıdır.**

**Hasta hali hazırda kemoterapi alıyor ve uzun sürmesi bekleniyorsa, ya da grip mevsimi ve pandemi dönemleri gibi yüksek riskli dönemlerde, kemoterapi kürleri arasında da grip ve zatürre aşıları yapılabilir. Hasta kemoterapi alırken aşılandığında aşidan beklenen yararın düşük olacağı akılda tutulmalıdır.**

**Kanserli hastalarda ciddi Covid-19 enfeksiyon riski arttığından Covid-19 aşılması için Sağlık Bakanlığı'nın önerilerinin yakından takip edilmesi önerilir.**

\*\*\*Bu öneriler ulusal ve uluslararası kılavuzlar eşliğinde bugünkü koşullar dikkate alınarak yapılmıştır. Önerilerin değişen koşullara göre yenilenmesi planlanmıştır.